

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  
MÔI TRƯỜNG HÀ TĨNH  
CHI CỤC TRỒNG TRỌT  
VÀ CHĂN NUÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2026

Số: /TTCN-BVTV  
V/v hướng dẫn phòng trừ dịch hại trên lúa  
vụ Xuân 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 1983/SNNMT-TTCN ngày 26/3/2026 về tăng cường công tác phòng, trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân 2026. Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ các đối tượng dịch hại để khuyến cáo thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối với bệnh Đạo ôn cổ bông: Tổ chức rà soát, nắm chắc thời điểm trổ của các trà lúa, theo dõi sát tình hình thời tiết, giai đoạn lúa trổ nếu gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi (trời âm u, có mưa, sương mù vào đêm và sáng sớm), tiến hành tổ chức phòng trừ: Thời điểm phun thuốc lần 1 khi lúa trổ về (trổ 3-5%) và phun lại lần 2 khi lúa trổ thoát bằng một trong các loại thuốc có nhóm hoạt chất sau: Tricyclazole, Isoprothiolane, Fenoxanil; một số loại thuốc BVTV có hiệu lực phòng trừ cao đối với bệnh Đạo ôn và nồng độ, liều lượng khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m<sup>2</sup>) như sau:

Filia® 525 SE: Pha 30ml thuốc vào 20-25 lít nước;

Kasoto 200SC: Pha 30ml thuốc vào 20-25 lít nước

Flash 75WP: Pha 15 gam thuốc vào 20-25 lít nước;

Angate 75WP: Pha 25g thuốc vào 20-25 lít nước;...

2. Đối với Rầy nâu, Rầy lưng trắng: Theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình sự phát sinh gây hại của rầy, chú trọng vùng thấp trũng, vùng hàng năm rầy thường phát sinh gây hại, thực hiện điều tra phát hiện, chủ động hướng dẫn bà con tiến hành phun trừ kịp thời khi rầy tuổi 1, tuổi 2 bằng một trong các loại thuốc hóa học có tính lưu dẫn có hoạt chất Pymetrozine, Imidacloprid, Clothianidin, Acetamiprid; một số loại thuốc BVTV có hiệu lực phòng trừ cao đối với Rầy và nồng độ, liều lượng khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m<sup>2</sup>) như sau:

Chess® 50WG: Pha 25gram thuốc vào 20-25 lít nước;

Pexena® 20WG: Pha 10gram thuốc vào 20-25 lít nước;

Akulagold 260EW: Pha 50ml thuốc vào 20-25 lít nước;

Bassa 50EC: Pha 75ml thuốc vào 20-25 lít nước;...

3. Đối với bệnh Bạc lá: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động điều tra, giám sát nhất là trên diện tích gieo cấy các giống lúa nhiễm bệnh như: Thái Xuyên 111, Nếp 98, Bắc Thịnh, XM12, ...và các diện tích hàng năm bệnh thường phát sinh gây hại; sử dụng một trong các loại thuốc hóa học có hoạt chất Oxolinic acid,

Kasugamycin, Bronopol,... một số loại thuốc BVTV có hiệu lực phòng trừ cao đối với bệnh Bạc lá và nồng độ, liều lượng khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m<sup>2</sup>) như sau:

Totan 200WP: Pha 20-25gam thuốc vào 20-25 lít nước;

Kamsu 2SL: Pha 100-150ml thuốc vào 20-25 lít nước;...

4. Đối với bệnh Khô vằn: Tập trung giám sát đồng ruộng, chủ động phát hiện và hướng dẫn phun phòng trừ kịp thời khi bệnh chớm xuất hiện, chú trọng trên các diện tích sâu trồng, bón thừa đạm, gieo cây dày; sử dụng một trong các loại thuốc có nhóm hoạt chất sau: Validamycin, Difenconazole, Hexaconazole,... Một số loại thuốc thương phẩm sử dụng hiệu quả với bệnh Khô vằn và nồng độ, liều lượng khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m<sup>2</sup>) như sau:

Vida® 5WP: Pha 40-50 gam thuốc vào 20-25 lít nước;

Tilt Super® 300EC: Pha 15ml thuốc vào 20-25 lít nước;

A-V-T vil 5SC : Pha 40-50 ml thuốc vào 20-25 lít nước ;...

**\* Lưu ý: Phun thuốc BVTV vào những ngày tạnh ráo, không mưa, phun vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát để phát huy hiệu lực của thuốc; trong quá trình sử dụng thuốc phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” và hướng dẫn sử dụng trên bao gói.**

\* Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan chủ động theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch hại, phối hợp với các Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực tổ chức điều tra, giám sát; kịp thời tổ chức, hướng dẫn bà con phun phòng. Đối với các diện tích có nguy cơ nhiễm dịch hại nặng, nhất là bệnh Đạo ôn cổ bông có khả năng phát sinh gây hại, đề nghị phân công cán bộ bám sát địa bàn, tiến hành họp với từng thôn, xóm để tổ chức, triển khai các biện pháp phòng, trừ cụ thể và ký cam kết việc phun phòng với bà con nông dân để đảm bảo tổ chức, triển khai công tác phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

\* Giao Phòng Bảo vệ thực vật chủ trì theo dõi hàng ngày, tổng hợp tình hình, diễn biến dịch hại để tham mưu, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo; các Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn phối hợp với các địa phương thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống dịch hại./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trung tâm TT và BVTV vùng IV; } (để BC)
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Báo và PTTH Hà Tĩnh;
- Chi cục trưởng, PCCT;
- Các Phòng, Trạm trực thuộc;
- Lưu: VT.

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Trần Hùng**