

Số: 1934 /UBND-KT
V/v Hướng dẫn chăm sóc và phòng
trừ dịch hại trên lúa Hè Thu 2026

Đức Thọ, ngày 08 tháng 7 năm 2026

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp xã;
- Giám đốc các HTX nông nghiệp trên địa bàn xã;
- Thôn trưởng các thôn sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, trà lúa Hè Thu gieo sớm đang giai đoạn đứng cái - làm đòng bước 1, bước 2, trà lúa gieo cấy chính vụ cuối giai đoạn đẻ nhánh. Nhìn chung, cây lúa đang sinh trưởng, phát triển khá thuận lợi. Qua điều tra, theo dõi tình hình dịch hại trên cây lúa, sâu cuốn lá nhỏ đang xuất hiện với mật độ 1-5 con/m², nơi cao 8-10 con/m², trưởng thành đã vũ hóa rộ từ ngày 25-28/6/2026, hiện tại sâu chủ yếu ở pha trứng, sâu non tuổi 1, tuổi 2 xuất hiện rải rác, phân bố trên các cánh đồng; Rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ 30-50 con/m², nơi cao 80-100 con/m², rầy chủ yếu trưởng thành và trứng, rầy non tuổi 1 xuất hiện rải rác, rầy chủ yếu xuất hiện và gây hại trên các diện tích đã nhiễm rầy từ vụ Xuân 2026; Nhện gié phát sinh và gây hại trên trà lúa đẻ nhánh rộ - làm đòng; Bệnh khô vằn xuất hiện với tỷ lệ bệnh phổ biến 1-3%, vết bệnh chủ yếu cấp 1, phân bố trên trà lúa gieo sớm, ruộng gieo cấy dày; Bệnh nghệt rễ vàng lá, ngộ độc hữu cơ phát sinh với tỷ lệ phổ biến 5-10%, nơi cao 20-30%, bệnh chủ yếu cấp 1, cấp 3, phân bố trên các vùng cao ráo, thường xuyên thiếu nước, vùng ruộng sâu trũng; Chuột gây hại với tỷ lệ 2-3%, nơi cao 5-7 % ở các vùng ruộng giáp dăm cón, ven bờ vùng, bờ thửa ở các xã.

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục nắng nóng, xen kẽ có các đợt mưa, rất thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh, khó lường, tăng nhanh mật độ và có nguy cơ lây lan ra diện rộng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng và có khả năng gây thiệt hại đến năng suất lúa, nhất là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, nhện gié, bệnh khô vằn; sâu cuốn lá sẽ xuất hiện rộ lúa sâu non mới (sâu nỏ) từ nay đến ngày 06/7/2025, nhện gié, rầy nâu, rầy lưng trắng sẽ nhân số lượng gia tăng mật độ và gây hại mạnh giai đoạn lúa làm đòng - trổ.

Để chủ động phòng trừ, hạn chế thiệt hại do dịch hại gây ra, UBND xã đề nghị BCD sản xuất nông nghiệp xã, Giám đốc các HTX Nông nghiệp, Thôn trưởng các thôn tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cho người sản xuất tập trung một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến tận người sản xuất về tình hình dịch hại trên lúa hiện nay, những nguy cơ thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
2. Đôn đốc, hướng dẫn người dân chăm sóc cây lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi; cung cấp đầy đủ nước tưới và điều tiết nước hợp lý; bón phân cân đối, hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng phát triển;

Thực hiện bón thúc đón đòng kịp thời, với lượng bón cho 01 sào ruộng 500m²: 04-05 kg Kali + 01-02 kg đạm Ure.

3. Phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ chuyên môn Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực II, tập trung giám sát đồng ruộng, thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, theo dõi tình hình, diễn biến dịch hại trên cây lúa. Khi mật độ, tỷ lệ dịch hại phát sinh tăng đến ngưỡng phòng trừ thì hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ các đối tượng dịch hại kịp thời, hiệu quả:

3.1. *Đối với sâu cuốn lá hại lúa:* Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng vùng đồng để xác định chính xác thời điểm sâu non lúa mới nở rộ, nếu mật độ sâu tăng cao (*lúa giai đoạn làm đồng, phân hóa đồng có mật độ sâu từ 10 con/m² trở lên*) cần tập trung phun trừ giai đoạn sâu non tối 1- tuổi 2, sử dụng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu lực phòng trừ cao đối với Sâu cuốn lá; nồng độ, liều lượng khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m²) như sau:

- Incipio® 200SC: Pha 5ml thuốc vào 20-25 lít nước;
- Clever 150SC: Pha 9ml thuốc vào 20-25 lít nước;
- Obaone 95WG: Pha 15 gram thuốc vào 20-25 lít nước;
- Virtako 40WG: Pha 4,5 gram thuốc (1 gói) vào 20-25 lít nước;

3.2. *Đối với Nhện gié:* Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm triệu chứng nhện gié gây hại (*trên bẹ, các vết hại tập trung thành từng đám màu nâu nhạt, nâu đậm đến thâm đen trông giống như vết "cạo gió", nếu bị nặng toàn bộ bẹ lá, thân cây có màu nâu đen đậm*), nhất là các chân ruộng vằn cao thiếu nước, ruộng gieo cấy dày, bón nhiều phân đạm, vùng hàng năm nhện phát sinh gây hại; Cao điểm gây hại của nhện là giai đoạn lúa đồng già đến cuối vụ.

Trước lúc lúa trở 5-7 ngày nếu phát hiện có triệu chứng nhện gié gây hại từ 5% số dảnh, bẹ lá đồng thì tiến hành sử dụng một trong các loại thuốc BVTV có hoạt chất Quinalphos, Diafenthiuron, Emamectin benzoate, ... Một số loại thuốc thương phẩm có trên thị trường như: Obamax 25EC, Kinalux 25EC, Pegasu 500SC, Tasieu 1.9EC ...

3.3. *Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:* Thường xuyên kiểm tra, giám sát đồng ruộng, tập trung những ruộng thấp trũng, gieo cấy dày, bón thừa đạm, vùng hàng năm rầy thường phát sinh gây hại; khi mật độ rầy tăng cao (*trên 750 con/m²*) cần tiến hành phun phòng trừ kịp thời. Sử dụng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu lực phòng trừ cao đối với Rầy; nồng độ, liều lượng khuyến cáo phun cho 1 sào (500 m²) như sau:

- Chess® 50WG: Pha 25 gram thuốc vào 20-25 lít nước;
- Sutin 50SC: Pha 30 ml thuốc vào 20-25 lít nước;
- Pexena® 20WG: Pha 10gram thuốc vào 20-25 lít nước;
- Akulagold 260EW: Pha 50ml thuốc vào 20-25 lít nước;
- Bassa 50EC: Pha 75ml thuốc vào 20-25 lít nước.

3.4. *Đối với bệnh khô vằn:* Phun phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện, chú trọng trên các diện tích sâu trũng, bón thừa đạm, gieo cấy dày; sử dụng một trong các loại thuốc hóa học có hoạt chất Validamycin, Hexaconazole, Cyproconazole, Difenoconazole, các loại thuốc thương phẩm như: Vida 5WP, Validacin 5SL, Tilt super 300EC, Anvil 5SC, Nevo 330EC, ...

3.5. Đối với chuột hại: Thời kỳ lúa bước vào giai đoạn làm đòng, cây tích lũy nhiều dinh dưỡng nên chuột sẽ cắn phá gây hại mạnh. Các HTX nông nghiệp, các thôn cần phát động toàn dân ra quân giết chuột bằng các biện pháp như: biện pháp thủ công (đào bắt, đặt bẫy), biện pháp dùng bã sinh học, hóa học nhằm hạn chế chuột gây hại trên đồng ruộng.

Lưu ý: Trong quá trình sử dụng thuốc phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” và thực hiện việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định. Bên cạnh đó cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh đốm nâu, bệnh bạc lá, sâu đục thân ... và các đối tượng gây hại trên cây trồng khác để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Đề nghị Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã, Giám đốc các Hợp tác xã nông nghiệp, Thôn trưởng các thôn sản xuất nông nghiệp và các ban ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra cây trồng để kịp thời triển khai thực hiện việc chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh trên lúa Hè Thu 2026 kịp thời và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Mặt trận tổ quốc xã;
- Các tổ chức đoàn thể cấp xã;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH.
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trung Dũng