

Số: 1809 /UBND-NN  
V/v bổ cứu sản xuất vụ Hè  
thu năm 2021

*Đức Thọ, ngày 12 tháng 07 năm 2021*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Qua kiểm tra thực tế của BCĐ sản xuất huyện, hiện nay trà lúa Hè Thu không bị ảnh hưởng do mưa lũ (ngày 12-13/6) đang trong giai đoạn làm đọt - làm đòng bước 1; trà lúa Hè Thu bị ngập lũ từ 3-5 ngày đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ; trà lúa gieo cấy lại sau đợt mưa bão (gieo cấy từ 17-22/6) đang giai đoạn đẻ nhánh. Cây đậu: phân cành - ra hoa; cây lạc: phân cành. Nhìn chung các cây trồng vụ Hè thu sinh trưởng phát triển tốt.

Tuy nhiên trên các trà lúa đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại: Trà lúa gieo cấy muộn sâu keo gây hại với mật độ 5- 7con/m<sup>2</sup>, bọ trĩ 1-3%; Trà lúa thâm canh: bệnh nghệt rế vàng lá, ngộ độc hữu cơ gây hại 10-15%, cục bộ 30% trên các chân ruộng cao táo, thiếu nước, ruộng chua trũng; sâu cuốn lá nhỏ xen gỏi lúa trên đồng ruộng mật độ 3-5 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 7-10 con/m<sup>2</sup>, tuổi 2- tuổi 4, nhộng, trưởng thành, gây hại tập trung ở những ruộng xanh tốt; sâu đục thân tuổi 5, nhộng gây danh héo rải rác; Bệnh bạc lá do vi khuẩn gây hại cục bộ trên giống BT7, BT09 với tỷ lệ 2-5%, vết bệnh cấp 1 ở xã Bùi La Nhân; bệnh khô vằn gây hại trên trà lúa bước vào giai đoạn làm đòng với tỷ lệ phổ biến 1-3% vết bệnh cấp 1; Chuột gây hại rải rác 1- 2%, cục bộ 5-7% ở các vùng dăm cùn tại các xã Tân Dân, Thanh Bình Thịnh, Bùi La Nhân, Yên Hồ... Trên cây đậu: Bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác; rệp xanh gây hại với tỷ lệ 3-7%; Sâu xanh ăn lá mật độ 2-5con/m<sup>2</sup>, sâu tuổi 3-tuổi 4.

Trong thời gian tới dự báo thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa rào và giông nên các đối tượng sâu bệnh sẽ tiếp tục phát sinh gây hại, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh nghệt rế vàng lá, rầy nâu, rầy lưng trắng... Để chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ tốt kết quả sản xuất, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo người dân thực hiện một số biện pháp bổ cứu:

### **1. Trên cây lúa**

#### **a. Đối với trà lúa gieo cấy muộn (giai đoạn đẻ nhánh rộ, kết thúc đẻ nhánh)**

- Điều tiết đủ nước để người dân thuận lợi trong chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh thuận lợi, tập trung;

- Kiểm tra ruộng để phun phòng sâu keo, bọ trĩ ở những ruộng có mật độ cao bằng 1 trong những loại thuốc sau:

+ Voliam Targo 063 SC: Pha 10ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào.

+ Gonitor 5WDG; Tasieu 5WG: Pha 10g thuốc vào bình 18lít nước, phun 1 bình/sào.

+ Karate 2.5EC: Pha 20ml vào bình 18 lít nước, phun 1 bình/sào.

#### **b. Đối với trà lúa đang giai đoạn làm đọt - làm đòng**

- Đôn đóc bà con thường xuyên thăm đồng xác định thời gian lúa phân hóa đòng cho từng giống, từng ruộng để bón đôn đòng kịp thời đảm bảo cân đối với lượng bón từ 4-5 kg Kali (với các giống có số hạt trên bông cao như: LP5, ADI168,...

cần bón 6-7kg kali/sào) + 2-3kg đạm urê (tùy thuộc vào điều kiện đất đai, màu sắc lá để bón thêm đạm);

- Chi đạo công chức nông nghiệp môi trường, khuyến nông cơ sở thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nắm chắc tình hình sâu bệnh đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục nõn, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh nghệt rể vàng lá, ngộ độc hữu cơ... trên các trà lúa; Các HTX nông nghiệp dịch vụ cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu để phục vụ bà con;

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa đẻ nhánh ở những nơi có mật độ từ 25con/m<sup>2</sup> trở lên; Trà lúa bước sang giai đoạn làm đòng từ 10con/m<sup>2</sup> trở lên bằng 1 trong những loại thuốc sau:

+ Gonitor 5WDG; Tasieu 5WG: Pha 10g thuốc vào bình 18lít nước, phun 1,5 bình/sào.

+ Voliam Targo 063 SC: Pha 10ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào.

+ Marshal 200SC: Pha 20ml vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào.

- Đối với bệnh sinh lý nghệt rể vàng lá, ngộ độc hữu cơ:

*Bước 1:* Khi ruộng lúa bị bệnh vàng lá, nhổ lên thấy rể thối cần ngừng ngay việc bón phân đạm, phân NPK hoặc các loại phân bón lá (vì bộ rễ thối nên không thể hút dinh dưỡng được);

*Bước 2:* Rút nước ra khỏi ruộng để khô 2-3 ngày (nứt chân chim), sau đó đưa nước trở lại ruộng. Đối với những ruộng không rút được nước, tiến hành cào sục bùn;

*Bước 3:* Bón bổ sung phân lân nung chảy (15-20 kg/500m<sup>2</sup>) hoặc vôi bột 15-20 kg/500m<sup>2</sup>. Có thể bón bổ sung thêm phân bón qua lá (ưu tiên các loại phân có hàm lượng các nguyên tố vi lượng cao như: *Poly-feed, Humic, KH, Siêu lân ...*);

*Bước 4:* Sau khi xử lý 5-7 ngày, nhổ khóm lúa lên thấy rể trắng mới ra, tiến hành bón thúc và chăm sóc bình thường.

- Đối với bệnh bạc lá do vi khuẩn: Khi bệnh chớm xuất hiện cần tiến hành phun phòng bằng một trong những loại thuốc sau:

+ Xantocin 40WP: Pha 5g thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào.

+ Staner 20WP: Pha 20 gam thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào.

+ Kasumin 2SL: Pha 20-30ml thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào.

- Đối sâu đục thân: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi thấy ổ trứng xuất hiện thì sau 5-7 ngày tiến hành phun phòng trừ sâu non bằng một trong những loại thuốc sau:

+ Voliam Targo 063 SC: Pha 10ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào.

+ Marshal 200SC: Pha 20ml vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào.

+ Virtako 40WG: Pha 1,5 gam vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào;

- Đối với bệnh khô vằn: Tập trung phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện nhằm hạn chế bệnh lây lan phát tán trên đồng ruộng, sử dụng các loại thuốc có các nhóm hoạt chất sau: Validamycin, Azoxystrobin, Difenoconazole, Propiconazole: Các loại thuốc thương phẩm hiện có trên địa bàn huyện như:

+ Vida 5WP: Pha 50 g thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m<sup>2</sup>;

+ Validacin 5SL: Pha 40ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m<sup>2</sup>;

+ Anvil 5SC: Pha 50ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào 500m<sup>2</sup>;

+ Nevo 330EC; Tilsuper 300EC Pha 20ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 500m<sup>2</sup>.

- Đối với chuột: Các xã, HTX nông nghiệp phát động toàn dân tập trung triển khai công tác diệt chuột đồng loạt bằng các biện pháp: Biện pháp thủ công ( đào bắt, đặt bẫy cơ học), đặt bã sinh học, bã hóa học nhằm hạn chế chuột gây hại giai đoạn lúa làm đòng – trổ.

## **2. Trên cây đậu, lạc:**

Vùn gốc, bón phân cho cây đậu, lạc theo đúng quy trình kỹ thuật, đồng thời thường xuyên kiểm tra thăm đồng để phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời các đối tượng: rệp, sâu khoang, sâu xanh gây hại;

- Đối với rệp xanh: Dùng các loại thuốc sau

+ Sutin 50SC : Pha 1 gói 15 ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào;

+ Bassa 50EC: Pha 30-40 ml vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào.

- Đối với nhóm sâu ăn lá

+ Angul 5 WDG: Pha 5gam gói vào bình 10-12 lít nước, phun 3 bình/sào;

+ Match 050 EC: Pha 10ml cho bình 18-20 lít nước, phun 1 bình/sào.

Đề nghị phòng NN& PTNT phối hợp với trung tâm UD KHKT & BVCTVN kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện;

Yêu cầu chủ tịch UBND, BCĐ sản xuất nông nghiệp các xã, thị trấn, các HTX sản xuất nông nghiệp triển khai có hiệu quả các biện pháp kỹ thuật. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc cần phối hợp với cán bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trung tâm UDKHKT& BVCTVN để có biện pháp bổ cứu chỉ đạo kịp thời./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT Huyện ủy – HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng NN, Trung tâm UDKHKT&BVCTVN
- Trung tâm VH-TT;
- Lưu VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Đức**